

農林水産省登録
第22791号

芝生用除草剤



シバッチ®

乳剤

®はシンジェンタ社の登録商標です。

ダラダラ発生傾向の
雑草への対応が
期待できます!



予算内での
雑草管理対策に
貢献できます!

 シバッチ®
乳剤

syngenta®

TM



芝生用除草剤

シバッチ® 乳剤

- ◇農林水産省登録：第22791号
- ◇有効成分：S-メトクロール……………83.7%
- ◇包装：1ℓ×6本
- ◇有効年限：4年
- ◇毒物および劇物取締法：非該当
- ◇危険物：第4類第3石油類
- ◇作用機分類番号(RAC番号)：除草剤分類 **K3**

■ 特長

- ◇幼芽部の伸長や、根の発生および伸長を抑制し、雑草を枯殺します。
- ◇予算内での雑草管理対策に貢献できます。
- ◇人と環境に配慮した優しい薬剤です。

■ 適用表および使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	メトクロール及びS-メトクロールを含む農業の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生雑草	春夏期雑草発生前 (芝生育期)	0.2～0.4 mℓ/m ²	200～300 mℓ/m ²	3回以内	全面 土壌散布	3回以内
		秋冬期雑草発生前 (芝生育期)	0.25～0.4 mℓ/m ²				
日本芝 (こうらいしば)	ヒメクグ	ヒメクグ 発生前～発生初期 (芝生育期)					

■ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 発芽後の雑草に対しては、効果が劣るので必ず雑草発生前に時期を失しないように散布すること。
- ヒメクグに使用する場合は、1回目処理はヒメクグ発生前に、2回目処理はヒメクグ発前から発生初期に散布すること。
- 有機物の多い土壌や粘土質の土壌では所定範囲内で多めの薬量を散布すること。
- 寒地型西洋芝やパーミュダグラスには薬害を生じる恐れがあるので、付近にある場合にはかからないように注意すること。
- 本剤の使用に当っては、その日の天候に留意し、降雨が予想される時には使用を避けること。
- 散布液の飛散や流出によって、周辺の有用作物に影響を及ぼすことのないよう十分に注意して散布すること。
- 使用後の容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないように適切に処理すること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。

■ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗いし、適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

プロフェッショナル ソリューション事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX21階

TEL:03-6221-3802 FAX:03-6221-3899

http://www.syngenta.co.jp/golf

取扱い