



芝生用殺菌剤

センチネル[®]

顆粒水和剤

ラージ、春はけ等、日本芝の病害防除の基本



ネクロティック
リングスポット病
に適用拡大



syngenta[®]

- 成分：シプロコナゾール………40.0%
鋳物質微粉、界面活性剤等……60.0%
- 人畜毒性：普通物
- 包装：200g×10

適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シプロコナゾールを含む農薬の総使用回数
日本芝	葉腐病(ラージパッチ) カーブラリア葉枯病 ヘルミントスポリウム葉枯病 疑似葉腐病(象の足跡) さび病	2500倍	発病初期	4回以内	1㎡当り 250mℓ散布	4回以内
	立枯病(ゾイシアデクライン) 疑似葉腐病(春はげ症)		休眠期前			
	ネクロティックリングスポット病	2000~2500倍				

上手な使い方

対象病害と散布時期

- ラージパッチ(春)：ラージパッチ発生前
- ラージパッチ+春はげ症(秋)：ラージパッチ発生前
- 葉枯病(5~6月及び9月)：発生前~発生直後
- ゾイシアデクライン：10~11月(5~6月)

薬量・水量

- ㎡当たり薬量0.1g、散布水量250mℓを守る。

散布方法

- 葉枯性病害に対しては茎葉散布を心掛けてください。
- ラージパッチ等芝生の茎、地際部に発生する病害に対しては散布水量を守り(250mℓ/㎡)地際部への散布を心掛けることにより安定した効果が期待できます。
- グリーンでは使用しないでください。



効果・薬害等の注意

- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
- 本剤は発病前から発病初期に有効なので、時期を失しないように散布してください。
- 西洋芝には薬害を生ずる恐れがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。(水産動植物に関する注意：この登録に係る使用方法では該当しません。)

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。

- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。

輸入販売元

シンジェンタ ジャパン株式会社

プロフェッショナル・プロダクツ部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
(TEL)03-6221-3802 (FAX)03-6221-3899
www.syngenta.co.jp/golf

取扱い