

芝生用殺菌剤

農林水産省登録
第22532号



メダリオン[®]

水和剤

©はシンジェンタ社の登録商標です。

炭疽病でお困りですか？ ローテーションの悩み、 メダリオンでリセットしませんか

- 新規系統薬剤で夏場の炭疽病へのローテーション散布が楽になります。
- ベントグラスへの安全性が高いので真夏でも安心して使用できます。
- ベントグリーンに発生するやっかいな藻類も防除する事ができます。



メダリオン[®]
水和剤

syngenta[®]

TM

芝生用殺菌剤



メダリオン®

水和剤

(フルジオキシニル水和剤)

農林水産省登録 第22532号

- 包装：400g×5袋
- 成分：フルジオキシニル…………… 50.0%
 鉱物質微粉、界面活性剤等 …… 50.0%
- 人畜毒性・毒物及び劇物取締法：非該当

夏場のローテーション散布が楽に!!

メダリオンを組み入れることでEBI系に頼りがちな夏場のローテーション散布が楽になります。

少水量散布にも対応!!

炭疽病に対する散布水量は、500ml/m²のほかに50ml/m²、100ml/m²の登録があります。少水量散布によって、散布にかかわる時間と手間が軽減できます。

ベントグリーンに安全!!

全国のゴルフ場での現地試験、倍量薬害試験によってベントグラスに対する高い安全性が確認されています。真夏の高温時でも安心してご使用いただけます。

藻類にも効果があります!!

予防的な散布によってベントグリーンのやっかいな藻類の発生を抑えます。病害との同時防除が狙えます。

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病(ブラウンパッチ)	1250~2500倍	500ml/m ²	発病初期	4回以内	散布	4回以内
	デッドスポット病						
	炭疽病	250倍	50ml/m ²				
		500倍	100ml/m ²				
	紅色雪腐病	833~1250倍	500ml/m ²	根雪前			
ドレクスレラ葉枯病	1250~2500倍	500ml/m ²		発病初期			
日本芝			カーブラリア葉枯病				

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
西洋芝 (ベントグラス)	藻類	藻類発生初期	200~400g/10a	500l/10a	4回以内	散布	4回以内

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 使用後は洗眼してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
 (水産動植物に関する注意:この登録に係る使用方法では該当しません。)

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせて薬剤を調製し、使いきってください。
- 藻類に対して使用する場合は、散布タイミングを逃さないように発生初期に本剤を散布し、十分な効果が得られない場合には、14日前後の間隔で反復処理を行ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

ローン アンド ガーデン事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
 TEL.03-6221-3802 FAX.03-6221-3899
<http://www.syngenta.co.jp/golf>

取扱い