



ビートルカップ®

顆粒水和剤

農林水産省登録第21937号
有効成分:チアメトキサム:25.0%
毒物及び劇物取扱い:非該当

包装:250g×10袋
有効年限:4年

特長

- ◎芝への優れた浸透移行性及び食毒作用により、少量散布が可能です
- ◎長期残効型なので散布回数が減らせ、コース管理作業の効率がアップします
- ◎薬剤を取り込んだ幼虫は食害をすみやかに停止するのでターフが早く回復します
- ◎各種芝草(日本芝、西洋芝)に高い安全性を示します

適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む 農薬の総使用回数
芝	コガネムシ類幼虫	4000倍	1~2ℓ/m ²	発生初期	3回以内	散布	3回以内
		400~800倍	0.1ℓ/m ²				
		800~1600倍	0.2ℓ/m ²				
	シバオサゾウムシ成虫	2000倍	0.5ℓ/m ²				
	シバオサゾウムシ幼虫	4000倍	1ℓ/m ²				
		400~800倍	0.1ℓ/m ²				
800~1600倍		0.2ℓ/m ²					

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態、散布器具及び散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液は調製した日に使い切ってください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチ及びマルハナバチ等の巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用后十分に水で洗浄してください。また、洗浄した廃液ならびにやむを得ず使い残した散布液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
- 使用後の空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗顔してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合には、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないように縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動植物に関する注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

貯蔵上の注意

- 保管の際には、使い残した薬剤は密閉し、食品と区別し、直射日光が当たらない低温な場所に密封して保管してください。