



農林水産省登録第17229号 包装: 250ml×4
 有効成分: パクロブトラゾール: 21.5% 5ℓ×3
 毒物及び劇物取締法: 非該当 有効年限: 3年

特長

- ◎美観を維持できます
- ◎計画的な散布ができます
- ◎危険な刈込作業が減らせます

使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用目的	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	パクロブトラゾールを含む農業の総使用回数
					薬量	希釈水量			
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	一年生雑草 (シロザ、アオビユを除く) 多年生雑草	草丈の伸長抑制による刈込軽減	雑草生育初期又は生育中期刈込直後	2 ~ 3ℓ/10a	100 ~ 300ℓ/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内

作物名	使用目的	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	パクロブトラゾールを含む農業の総使用回数
		薬量又は希釈倍数	希釈水量				
日本芝	草丈の伸長抑制による刈込軽減	750 ~ 1500mℓ/10a	100 ~ 300ℓ/10a	生育期	2回以内	全面散布	2回以内
	一年生雑草の生育抑制による発生密度の低減			雑草生育初期		雑草茎葉散布又は全面土壌散布	
西洋芝 (ベントグラス)	スズメノカタビラ生育抑制による発生密度の低減	40 ~ 80mℓ/10a	100 ~ 200ℓ/10a	秋冬期スズメノカタビラ発生前～初期	1回	全面土壌散布	2回以内
	スズメノカタビラ出穂抑制			春夏期スズメノカタビラ出穂前			
西洋芝 (ブルーグラス) 西洋芝 (ライグラス) 西洋芝 (フェスク) 西洋芝 (オーチャードグラス)	草丈の伸長抑制による刈込軽減	400mℓ/10a	100 ~ 300ℓ/10a	刈込7日前～刈込直後	2回以内	全面散布	
樹木類	新梢伸長抑制及び整枝・刈込・剪定軽減	250 ~ 500倍	200 ~ 700ℓ/10a	新梢伸長開始期又は刈込・剪定後新梢伸長開始期	1回	茎葉散布	1回
アベリア	新梢伸長抑制及び整枝・剪定軽減	0.6 ~ 1.2mℓ/m ²	1 ~ 5ℓ/樹	萌芽前		土壌灌注	
やまもも (緑化木)				萌芽前又は剪定7 ~ 10日前			
とうかえで いぬつげ				萌芽前又は剪定前			

効果・薬害等の注意

一般的注意事項

- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- 他の薬剤との混用は避けてください。
- 極端な乾燥条件下での使用は避けてください。
- 極端に樹勢や生育が旺盛な場合には、効果が不十分な場合があるので注意してください。
- 樹勢や生育が弱っている場合や生理障害が出やすい条件下では使用しないでください。
- 幼木では使用しないでください。
- 散布直後に降雨があった場合でも、再散布はしないでください。
- 本剤の伸長抑制効果は、一般に使用量が多いほど効果が高くなる傾向があるので、希望する抑制程度に合わせて所定の範囲内で使用量を決めてください。
- 本剤の施用により翌年まで効果が持続することがあるので、次年度の処理に際しては、その反応に応じて薬量を適宜調整してください。
- 本剤は対象作物以外の作物にも影響を及ぼすので、周辺作物にかからないように注意してください。また、使用後の噴霧器等は十分洗浄してください。
- 桑畑が周辺にある場合は、飛散しないよう注意して散布してください。
- 本剤は他の作物を植え付ける予定のある土地では使用しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 水源池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

本剤を芝に使用する場合、一般的注意事項の他に下記の事項にも注意してください。

- 本剤の使用により、葉の色や形が変化する等の症状がみられる場合があるので、まきむらのないよう均一に散布してください。
- 効果発現までに、条件により5 ~ 10日間位要するので、その間は通常どおりの刈込管理を行ってください。
- 草丈の伸長抑制による刈込軽減目的で使用する場合には、ゴルフ場のグリーン上では使用しないでください。

本剤を樹木類に使用する場合、一般的注意事項の他に下記の事項にも注意してください。

- 本剤の連年施用により枝および葉の生育や開花等に影響を及ぼす恐れがあるので注意してください。また、食用には供さないでください。
- 本剤はポット・プランター等の容器栽培のポインセチアには抑制効果が高くなるので使用しないでください。
- 下記の作物以外又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
 ・つつじ類、つげ、いぬつげ、まめつげ、ボックスウッド、さざんか、まてばしい、やまもも (緑化木) 及びとうかえで。

安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、薬液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は、手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後 (少なくとも使用当日) に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

貯蔵上の注意

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。