



ヘリテージ®

顆粒水和剤

農林水産省登録第21938号

包装: 250g×4袋

有効成分: アゾキシストロピン: 50.0%

有効年限: 4年

毒物及び劇物取締法: 非該当

特長

- ◎広範囲の病害を同時に防除できます
ブラウンパッチ、ラージパッチ、フェアリーリング病、春はげ症、ゾイシアデクラインなど
- ◎残効が長いため散布回数の低減が出来ます

適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む 農薬の総使用回数
芝 (日本芝)	葉腐病 (ラージパッチ)	800倍	発病初期	8回以内	100mℓ/m ² 散布	8回以内
		400倍			50mℓ/m ² 散布	
	3000~4000倍	休眠期前	200~500mℓ/m ² 散布			
	フェアリーリング病	2000倍	500mℓ/m ² 散布			
	立枯病 (ゾイシアデクライン)	2000倍				
芝 (ペントグラス)	赤焼病	3000~4000倍	発病初期	8回以内	500mℓ/m ² 散布	8回以内
	ピシウム病	2000倍	根雪前			
	フェアリーリング病					
	紅色雪腐病	3000~4000倍	発病初期			
	葉腐病 (ブラウンパッチ)	800倍				
400倍		50mℓ/m ² 散布				

効果・薬害等の注意

- りんごの一部品種(あかね、旭、ガラ、きざし、モーリーズデリシャス、ラリタン等)に散布液がかかった場合には、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので十分注意してください。また、周辺にこれら品種が栽培されている場合は、飛散(ドリフト)により、薬害を生じる場合があります。
- 耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用を避け、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所などの関係機関の指導を受けてください。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動植物に関する注意

- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないよう調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

貯蔵上の注意

- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。