



メダリオン®

水和剤

農林水産省登録第22532号
有効成分：フルジオキシニル：50.0%
毒物及び劇物取締法：非該当

包装：400g×5袋
有効年限：4年

特長

- ◎夏場の炭疽病のローテーション散布が楽になります
- ◎ベントグラスへの安全性が高く少量散布にも対応できるため、ベントグリーンに安心してご使用いただけます
- ◎予防的な散布で藻類の発生も効果的におさえることができます

適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	1250~2500倍	500mℓ/m ²	発病初期	4回以内	散布	4回以内
	デッドスポット病						
	ドレクスレラ葉枯病						
	炭疽病	250倍	50mℓ/m ²				
		500倍	100mℓ/m ²				
日本芝	紅色雪腐病	833~1250倍	500mℓ/m ²	根雪前	4回以内	4回以内	
	カープラリア葉枯病	1250~2500倍		発病初期			

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
西洋芝 (ベントグラス)	藻類	藻類発生初期	0.2~0.4g/m ²	500mℓ/m ²	4回以内	散布	4回以内

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬剤を調製し、使いきってください。
- 藻類に対して使用する場合は、散布タイミングを逸しないように発生初期に本剤を散布し、十分な効果が得られない場合には、14日後の間隔で反復処理を行ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

貯蔵上の注意

- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。