



# センチネル<sup>®</sup>

## 顆粒水和剤

農林水産省登録第21964号  
有効成分：シプロコナゾール：40.0%  
毒物及び劇物取締法：非該当

包装：200g×10袋  
有効年限：5年

### 特長

- ◎ラージパッチを中心に、ネクロティックリングスポット病など広範囲の病害を同時に防除できます
- ◎浸透移行性に優れ、芝体の直立茎及び根部から速やかに吸収されるので、安定した効果が得られます

### 適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シプロコナゾールを含む 農薬の総使用回数
日本芝	葉腐病（ラージパッチ）	2500倍	発病初期	4回以内	250ml/m <sup>2</sup> 散布	4回以内
	カーブラリア葉枯病					
	ヘルミントスポリウム葉枯病					
	擬似葉腐病（象の足跡）					
	さび病					
	立枯病（ゾイシアデクライン）					
	擬似葉腐病（春はげ症）	2000～2500倍	休眠期前			
ネクロティックリングスポット病						

### 効果・薬害等の注意

- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
- 本剤は発病前から発病初期に有効なので、時期を失しないように散布してください。
- 西洋芝には薬害を生ずるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

### 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

### 貯蔵上の注意

- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。