



農林水産省登録22186号  
有効成分:アゾキシストロピン:9.2%  
ヘキサコナゾール:5.7%

毒物及び劇物取締法:非該当  
包装:1ℓ×10本  
有効年限:3年

## 特長

◎日本芝病害の総合防除剤として、美しいターフ造りをサポートします

## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを 含む農薬の 総使用回数	ヘキサコナゾールを 含む農薬の 総使用回数	
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	100倍	50mℓ/m <sup>2</sup>	発病初期	4回以内	散布	8回以内	4回以内	
		200倍	100mℓ/m <sup>2</sup>						
	立枯病 (ゾイシアデクライン) 疑似葉腐病 (象の足跡) カープラリア葉枯病	333 ~ 500倍	200mℓ/m <sup>2</sup>						休眠期前
	ダラースポット病	333 ~ 400倍							
	疑似葉腐病 (春はげ症)	333 ~ 500倍							
	ネクロティックリング スポット病	250 ~ 500倍							

◆標準的な使用液量は0.5 ~ 0.6mℓ/m<sup>2</sup>

- ◎ 1,000ℓタンクに対して2.5 ~ 3本を目安にご使用ください(散布水量200mℓ/m<sup>2</sup>、5,000m<sup>2</sup>散布の場合)
- ◎ 高めの散布液量で早期の予防散布を心掛けることで、より安定した効果と残効性、春先の均一な萌芽が期待できます。

## 効果・薬害等の注意

- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬剤を調製し、使いきってください。
- 寒地型西洋芝のグリーンには薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
- りんごの一部品種(あかね、旭、ガラ、きざし、モーリーズデリシャス、ラリタン等)では、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので十分注意してください。また、周辺にこれらの品種が栽培されている場合には、飛散(ドリフト)により薬害を生じる場合がありますので、散布液がかからないよう十分注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- きゅうり、キャベツ、トマト、だいず、には薬害を生じるおそれがあるので、周辺にそれらの作物がある場合にはかからないように注意してください。
- 耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

## 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

## 貯蔵上の注意

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。