


芝生地に発生する主な雑草の発生消長



※¹ 通常是一年生(越年生)ですが、生育条件によって二年生となる個体もあります。

※ 生育時期や発生(発芽)、開花のピークやタイミングは、生育する地域の気象条件やコース内の発生場所、管理環境等によって異なります。

主な雑草



スズメノカタビラ



メヒシバ



ヒメクグ



セイヨウタンポポ



オランダミミナグサ



タネツケバナ




オオイヌノフグリ



チドメグサ




ヤハズソウ



シロツメクサ

芝生における病害の発生消長

■ :発生ピーク ■ :やや発生



※太平洋沿岸の平地での発生状況

主な病害



葉腐病 (ブラウンパッチ)



炭疽病



赤焼病



紅色雪腐病



デッドスポット病



フェアリーリング病



ダラススポット病



葉枯病



葉腐病 (ラージパッチ)



雪腐黒色小粒菌核病



疑似葉腐病 (象の足跡)



疑似葉腐病 (春はげ症)



立枯病 (ゾイシアデクライン)




さび病




ネクロティックリングスポット病

芝生における害虫の発生消長

コウチュウ目




チョウ目



樹木における主要害虫の発消長

チョウ目

※各害虫の発生や接食被害の時期やピークは発生する地域の気象環境に左右されます。



コウチュウ目

