



# メダリオンアクション<sup>®</sup> 水和剤

## +Action

農林水産省登録第24481号 毒物及び劇物取締法:非該当  
 有効成分:アシベンゾラルS-メチル:0.25% 包装:400g×5袋  
 フルジオキシニル:50.0% 有効年限:3年

### 特長

- ◎ フルジオキシニルが、炭疽病(糸状菌)に対して高い予防・治療効果を発揮します
- ◎ アシベンゾラルS-メチルが、褐条病(細菌)の植物体内への侵入・感染を阻止します
- ◎ シーズンを通して複数回散布することで、夏場のペントグリーンの褐条病、炭疽病に安定した効果が期待できます
- ◎ ベントグラスへの安全性が高く、真夏の散布でも薬害の心配がありません

### 適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アシベンゾラルS-メチルを含む農薬の総使用回数	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ペントグラス)	褐条病	125～250倍	50mℓ/m <sup>2</sup>	発病前～ 発病初期	4回以内	散布	4回以内	4回以内
		250～500倍	100mℓ/m <sup>2</sup>					
	炭疽病	1250～2500倍	500mℓ/m <sup>2</sup>					

### 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤の使用により春期および秋期に葉の退緑もしくは濃緑色化が見られることがありますが、やがて回復し、その後の生育に対する影響は認められていません。
- 空容器、空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

### 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

### 貯蔵上の注意

- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。