



# モニメント<sup>®</sup>

## フロアブル

農林水産省登録第22045号

有効成分：トリフロキシスルフロナトリウム塩：10.0%

毒物及び劇物取締法：非該当

包装：500mℓ×4本

有効年限：4年

危険物：第4類第3石油類

### 特長

- ◎緑色の景観を維持しつつ、雑草の管理できます
- ◎年間の管理作業時間・回数を軽減できます
- ◎作業中、周囲、環境に対して安全性が高く、安心して使用することができます

### 適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	トリフロキシスルフロナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	一年生雑草及び多年生広葉雑草	雑草生育初期又は刈り取り後再生期	0.05~0.1 mℓ/m <sup>2</sup>	100~250 mℓ/m <sup>2</sup>	2回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	2回以内
日本芝	—	一年生雑草	雑草発生初期	0.025~0.05 mℓ/m <sup>2</sup>	100~200 mℓ/m <sup>2</sup>		雑草茎葉散布又は全面土壌散布	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用目的	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	トリフロキシスルフロナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
					薬量	希釈水量			
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	多年生イネ科雑草	草丈抑制による刈り取り軽減	雑草生育期又は刈り取り後再生期	0.05~0.1 mℓ/m <sup>2</sup>	100~250 mℓ/m <sup>2</sup>	2回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	2回以内

### 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前によく振ってから使用してください。
- 本剤は雑草の発生初期から生育期に有効なので、時期を失しないように均一に散布してください。
- 西洋芝では薬害を生じるので使用しないでください。特にゴルフ場においては、西洋芝を使用しているグリーンやティーランド周辺では使用しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、その日の天候に留意し、降雨が予想される時には使用を避けてください。
- 本剤の効果は遅効的で、雑草生育期に処理した場合、雑草が完全に枯れるまで30日程度かかるので、まき直しなどをしないでください。
- 散布液の飛散や流出によって、周辺の有用作物に影響を及ぼすことのないよう十分に注意して散布してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、水源池等に本剤が飛散・流入しないように十分注意してください。
- 本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用后十分に洗浄し、他の用途に使用する場合の薬害の原因にならないように注意してください。また、洗浄した廃液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
- 使用後の容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

### 安全使用上の注意

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園、庭園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

### 貯蔵上の注意

- 火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。