



テンダラー®

フロアブル

農林水産省登録24576号
有効成分：ピジフルメトフェン：18.3%

毒物及び劇物取締法：非該当
包装：500mℓ×6本
有効年限：3年

特長

- ◎有効成分が葉のワックス層に素早く吸着し、葉の内部に徐々に分布するので、浸透性と耐雨性が期待できます
- ◎ダラースポット病に対して、長い残効性が期待できます
- ◎フロアブル剤なので、においが少なく、調製しやすいです

適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピジフルメトフェンを含む農業の総使用回数
日本芝 西洋芝 (ベントグラス) 西洋芝 (ブルーグラス)	ダラースポット病	2500倍	500mℓ/m ²	発病初期	1回	散布	1回
		500倍	100mℓ/m ²				

効果・薬害等の注意

- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 水源池、河川、養殖池等に本剤が飛散流入しないよう十分に注意してください。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

貯蔵上の注意

- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。