



アグリーン®

顆粒水和剤

農林水産省登録第22358号 包装:50g×20袋
有効成分:ピラゾスルフロンエチル:70.0% 有効年限:5年
毒物及び劇物取締法:非該当

特長

- ◎各種広葉雑草・カヤツリグサ科雑草に安定した除草効果を示します
- ◎日本芝だけでなく、ペントグラス、ティールランドでも使用できます

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生及び 多年生広葉雑草	雑草生育期	20～ 30 g/10a	150～ 300 ㍉/10a	3回以内	散布	3回以内
	ヒメクグ ハマスゲ	春夏期雑草生育期					
西洋芝 (ペントグラス)	一年生及び 多年生広葉雑草	雑草生育期					

◆標準的な使用薬量は0.02g/m²

- ◎ 1,000㍉タンクに対して2袋(100g)を目安にご使用ください(散布水量200m㍉/㎡の場合)
(ただし多年生広葉雑草などに対しては、0.03g/m²をお薦めいたします)
- ◎ 発生初期(1～3葉期まで)の散布によって安定した高い効果が得られます
- ◎ イヌノフグリ類、ヤハズソウ、チチコクザ、ジシバリ、チドメグサ、ギシギシ、ヒメスイバ、スミレ類などの雑草に対して安定した効果が得られないので、これらの雑草が優先する場所ではこれらの雑草に対して効果の高い薬剤と組み合わせるお使いください。

効果・薬害等の注意

- 生育の進んだ雑草には効果が劣る場合があるので、時期を失しないように散布してください。
- 周辺の植物にかかる薬害を生じるので、散布の際は芝生の中や付近にある草花や花木、畑作物などに薬液がかからないようその付近での散布はさけてください。
- 本剤散布に用いた器具類は、使用後直ちに洗浄し、他の用途に使用する場合は薬害の原因にならないように注煮してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- グリーンでの使用は薬害を生じる可能性があるため避けてください。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動植物に関する注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。