

シンジエンタ アセルプリン®

農林水産省登録第23941号

有効成分：クロラントラニプロール：18.4%
毒物及び劇物取締法：非該当

包装：100mL×6本

有効年限：3年

特長

- ◎優れた長期残効性を示し、薬剤散布の手間を軽減することができます
- ◎チョウ目に対し高い効果を示しますので、コース内の効率的な害虫対策にお役立ていただけます
- ◎芝や人畜への安全性が高く、臭いの心配もないため、安心してお使いいただけます

適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
芝	スジキリヨトウ	0.02mL/m ²	200mL/m ²	発生前～発生初期	2回以内	散布	2回以内
	シバトガ	0.03mL/m ²	50～300mL/m ²				
	タマナヤガ						
	コガネムシ類幼虫	0.05mL/m ²	500mL/m ²				
		0.1mL/m ²	200～1000mL/m ²				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数
芝	スジキリヨトウ	27倍	0.8mL/m ²	発生前～発生初期	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		54倍	1.6mL/m ²				
樹木類 (さくらを除く)	ケムシ類	10000～20000倍	200～700L/10a			散布	6回以内
さくら	ケムシ類 イラガ類						

効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 過度の連用をさせ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 散布液が池、河川などに入らないように注意してください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
 - ① 散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ② 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布液調製時及び散布の際は、保護眼鏡、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動植物に関する注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

貯蔵上の注意

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。